

Микрофид Пав®



Микрофид Пав®

Поверхностно-активное вещество (прилипатель)

повышает эффективность влияния действующего вещества и позволяет применять уменьшенные нормы пестицида

Этоксилат изодециловый спирт - не менее 90%



8 (861) 201-23-99

south_agrohim@mail.ru

yug-agrohim.ru

Краснодар, ул. Демуса 20/1

Инструкция на обороте

Состав:
RU Этоксилат изодециловый спирт.

Микроэлементы в хелатной форме:
Этоксилат изодециловый спирт - 90%

Микрофид Пав

Обеспечивает образование однородной пленки на поверхность листа - это содействует лучшему прилипанию препарата и его поглощению растением, следовательно, повышается скорость действия и эффективность пестицида. Допускается применение препарата в условиях высокой влажности, вероятности осадков, выпадении тумана, при этом удержание рабочего раствора на листе гарантировано. Добавление прилипателя в баковые смеси изменяет физический состав жидкости (плотность, текучесть), что уменьшает степень покрытия и попадания раствора на лист - поэтому рекомендуется применять ПАВ при обработке любыми пестицидами.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Совместим со всеми пестицидами и минеральными удобрениями. В баковую смесь препарат рекомендуется добавлять последним.

Класс опасности для человека: 4 (МАЛООПАСНЫЕ)

Условия хранения: Температура хранения: от 0 до 35 ос.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Хранить в закрытой таре, сухом закрытом помещении, в местах, не доступных для детей и животных.

Срок годности и гарантийного хранения: 3 года с даты изготовления.

Рекомендации по применению препарата:

Норма расхода: 0,2 л/га

Преимущества применения препарата:

- Благодаря активным компонентам, образующим тонкую пленку, уменьшает расход препарата;
- Защитная пленка препятствует стеканию, испарению и потере препаратов с листовой поверхности, смыванию росой, дождем, туманом;
- Повышает скорость проникновения и эффективность действия пестицидов, биопрепаратов в растении;
- Длительность действия препаратов пролонгируется до 5-7 дней;
- Совместим со всеми пестицидами.

Меры предосторожности: при работе с препаратом используйте перчатки. При случайном проглатывании препарата прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, Энтерумин", "Полисорб" и др. в соответствии с рекомендациями по их применению, за ем раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу. При вдыхании вести пострадавшего на свежий воздух.

При необходимости обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу - промыть большим количеством проточной водой. При попадании в глаза - немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды.

При необходимости обратиться за медицинской помощью.

